

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1920

PRÉSIDENCE DE M. D. BOIS.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière séance, dont la rédaction est adoptée.

Par suite des présentations faites dans la dernière séance, M. le Président proclame membres de la Société :
MM. SCHOUTE (J.-C.), professeur à l'Université de Groningue (Hollande), présenté par MM. Bois et Lutz.

TALLON, ingénieur-chimiste à Salindres (Gard), présenté par MM. Gagnepain et Lutz.

M. F. Camus résume la communication suivante :

Diagnoses de *Pycreus* et *Cyperus* nouveaux de Madagascar;

PAR M. H. CHERMEZON.

Les dernières explorations de M. Perrier de la Bâthie, au cours de l'année 1920, ont encore fourni un très notable appoint à la connaissance des Cypéracées de Madagascar, et cela même dans des régions déjà souvent parcourues. C'est ainsi que la tribu des Cypérées se trouve enrichie de six espèces et une variété nouvelles, décrites ci-dessous.

Pycreus umbrosiformis n. sp. [sect. *Puncticulati*]. — Perennis, dense caespitosus, rhizomate subgracili (2-3 mm. diam.). Caulis modice validus, 30-45 cm. long., laevis, trigonus, inferne foliatus, basi haud bulbosus. Folia pauca, fere omnia approximata, caule breviora, 2 mm. lat., crassiuscula, firma, plicata, apice scabriuscula. Bractea involuocrales 2-3, erectae vel patentés, infima usque ad 8-12 cm. long. Anthela simplex, 3-5-radiata,